

## Feuille d'exercices n°17

### Espaces vectoriels

**Exercice 1.** Les ensembles suivants sont-ils des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels ?

1.  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$ .
2.  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$ .
3.  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ .
4.  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$ .
5.  $\{(x, 2x, 3x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .
6.  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0\}$ .
7.  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ .
8.  $E_1 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = P(2)\}$ .
9.  $E_2 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P'(0) = 2\}$ .
10. Pour  $A \in \mathbb{R}[X]$  non nul fixé,  $E_3 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid A \text{ divise } P\}$ .
11.  $E_4$ , l'ensemble des solutions de l'équation différentielle  $y' + a(x)y = 0$ , où  $a$  est une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .
12.  $E_5$ , l'ensemble des solutions de l'équation différentielle  $y' + a(x)y = x$ , où  $a$  est une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 2.** Montrer que les ensembles suivants, munis des opérations classiques, sont des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

1. l'ensemble des nombres complexes imaginaires purs.
2. l'ensemble des fonctions dérivables de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .
3. l'ensemble des matrices diagonales de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
4. l'ensemble  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), M^T = M\}$  des matrices symétriques de taille  $n \times n$ .

5. l'ensemble des fonctions paires (impaires) de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

6. l'ensemble  $\mathbb{R}_n[X]$  (avec  $n \in \mathbb{N}$  fixé).

**Exercice 3.** Soient  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$  et

$$G = \{(a - b, a + b, a - 3b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

1. Montrer que  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Déterminer  $F \cap G$ .

**Exercice 4.** Soit  $F = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = nu_{n+1} + u_n\}$ . Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

**Exercice 5.** Les familles suivantes de vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  sont-elles libres ? Si ce n'est pas le cas, déterminer une relation linéaire liant ces vecteurs :

1.  $(v_1, v_2)$  avec  $v_1 = (1, 0, 1)$  et  $v_2 = (1, 2, 2)$ .
2.  $(v_1, v_2, v_3)$  avec  $v_1 = (1, 0, 0)$ ,  $v_2 = (1, 1, 0)$  et  $v_3 = (1, 1, 1)$ .
3.  $(v_1, v_2, v_3)$  avec  $v_1 = (1, 2, 1)$ ,  $v_2 = (2, 1, -1)$  et  $v_3 = (1, -1, -2)$ .
4.  $(v_1, v_2, v_3)$  avec  $v_1 = (1, -1, 1)$ ,  $v_2 = (2, -1, 3)$  et  $v_3 = (-1, 1, -1)$ .

**Exercice 6.** 1. Trouver deux vecteurs engendrant le plan de  $\mathbb{R}^3$  d'équation  $x + y + z = 0$ .

2. Trouver l'équation du plan de  $\mathbb{R}^3$  engendré par les vecteurs  $v_1 = (1, 0, 1)$  et  $v_2 = (1, -1, -1)$ .

**Exercice 7.** Trouver la dimension des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels suivants et en donner une base.

1.  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .
2.  $\mathbb{C}^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .
3.  $\mathcal{M}_{pq}(\mathbb{R})$ ,  $p, q \in \mathbb{N}$ .
4. l'espace  $\mathbb{R}_n[X]$  des polynômes réels de degré  $\leq n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .
5. l'espace  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  des matrices symétriques de taille  $n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .
6. l'espace  $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$  des matrices antisymétriques de taille  $n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 8.** Soient  $v_1 = (0, 1, 1)$ ,  $v_2 = (1, 0, 1)$  et  $v_3 = (1, 1, 0)$ .

1. Montrer que les vecteurs  $v_1$ ,  $v_2$  et  $v_3$  forment une base de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Déterminer dans cette base les coordonnées du vecteur  $v = (1, 1, 1)$ .

**Exercice 9.** 1. Les familles suivantes de polynômes de  $\mathbb{R}[X]$  sont-elles libres ?

- (a)  $(P_1, P_2, P_3)$  avec  $P_1 = 1$ ,  $P_2 = 1 + 2X$  et  $P_3 = 1 + X + X^4$ .
- (b)  $(P_1, P_2, P_3)$  avec  $P_1 = 1 + X^2$ ,  $P_2 = 1 - X + X^2$  et  $P_3 = 1 + 2X + X^2$ .

2. Soient  $P_1 = 1$ ,  $P_2 = 1 + X$  et  $P_3 = 1 + X + X^2$ .

- (a) Montrer que la famille  $(P_1, P_2, P_3)$  forme une base de  $\mathbb{R}_2[X]$ .
- (b) Déterminer les coordonnées de  $P = 2 + 3X - X^2$  dans cette base.

**Exercice 10.** On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Décrire l'ensemble  $\mathcal{H}$  des éléments  $X \in \mathbb{R}^3$  tels que l'on ait  $A.X = 0_{\mathbb{R}^3}$ .

**Exercice 11.** On considère les vecteurs suivants de  $\mathbb{R}^4$  :

$$u_1 = (1, -2, 1, 2), u_2 = (1, -3, 1, 2), u_3 = (2, -4, 3, 4) \text{ et } u_4 = (1, -1, 2, 3).$$

1. Montrer que  $(u_1, u_2, u_3, u_4)$  est une base de  $\mathbb{R}^4$ .

2. Soient  $a, b, c, d$  des nombres réels. Calculer les coordonnées du vecteur  $(a, b, c, d)$  dans la base  $(u_1, u_2, u_3, u_4)$ .

3. Calculer les coordonnées, dans la base  $(u_1, u_2, u_3, u_4)$ , de chacun des vecteurs de la base canonique de  $\mathbb{R}^4$ .

**Exercice 12.** Parmi les sous-ensembles suivants de  $\mathbb{R}^4$ , préciser lesquels sont des sous-espaces vectoriels et lorsque c'est le cas, en donner une base :

1.  $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - y + t = 0\}$ .
2.  $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + 2z + t = 1\}$ .
3.  $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + t = 0 \text{ et } 2x + y - z = 0\}$ .
4.  $\{(3a + b, a - b, a + 5b, 2a + b) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$ .

**Exercice 13.** Vérifier que les ensembles suivants, munis des opérations classiques, sont des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels et déterminer une base de ces espaces :

1.  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tels que } x + y = y + z = 0\}$ .
2.  $\{P \in \mathbb{R}_3[X] \text{ tels que } P(X) = P(1 - X)\}$ .
3.  $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ telles que } u_n + u_{n+1} = 0\}$ .

**Exercice 14.** On considère les vecteurs suivants de  $\mathbb{R}^3$  :

$$u = (2, 3, -1), v = (1, -1, -2), x = (3, 7, 0) \text{ et } y = (5, 0, -7).$$

On note  $F = \text{Vect}(u, v)$  et  $G = \text{Vect}(x, y)$ .

1. Montrer que l'on a  $F = G$ .
2. Trouver une équation de  $F$ .

**Exercice 15.** Soit  $a$  un nombre réel. Quelle est la dimension du sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  engendré par les vecteurs  $(a+2, a, a-2)$ ,  $(1, a, -1)$  et  $(a, -a, 1)$  ?

**Exercice 16.** On considère les vecteurs suivants de  $\mathbb{R}^4$  :

$$u_1 = (-3, 1, 0, 2), u_2 = (-5, 2, 1, 2), u_3 = (1, 1, 4, -6) \text{ et } u_4 = (-1, 0, -1, 2).$$

1. Montrer que  $\text{Vect}(u_1, u_2) = \text{Vect}(u_3, u_4)$ .
2. Montrer que les vecteurs  $u_1$  et  $u_2$  sont linéairement indépendants. Compléter ces vecteurs pour former une base de  $\mathbb{R}^4$ .

**Exercice 17.** Dans  $\mathbb{R}^4$ , on considère les vecteurs

$u = (1, 0, 1, 0)$ ,  $v = (0, 1, -1, 0)$ ,  $w = (1, 1, 1, 1)$ ,  $x = (0, 0, 1, 0)$  et  $y = (1, 1, 0, -1)$ .

Soient  $F = \text{Vect}(u, v, w)$  et  $G = \text{Vect}(x, y)$ .

Quelles sont les dimensions de  $F$ ,  $G$ ,  $F + G$  et  $F \cap G$  ?

**Exercice 18.** Dans  $\mathbb{R}^3$ , déterminer une base et un supplémentaire des sous-espaces vectoriels suivants :

1.  $F = \text{Vect}(u, v)$  où  $u = (1, 1, 0)$  et  $v = (2, 1, 1)$ ,
2.  $F = \text{Vect}(u, v, w)$  où  $u = (-1, 1, 0)$ ,  $v = (2, 0, 1)$  et  $w = (1, 1, 1)$ ,
3.  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + 3z = 0\}$ .

**Exercice 19.** On considère dans  $\mathbb{R}^4$  les cinq vecteurs suivants :

$v_1 = (1, 0, 0, 1)$ ,  $v_2 = (0, 0, 1, 0)$ ,  $v_3 = (0, 1, 0, 0)$ ,  $v_4 = (0, 0, 0, 1)$  et  $v_5 = (0, 1, 0, 1)$ .

Dire si les sous-espaces vectoriels suivants sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^4$ .

1.  $\text{Vect}(v_1, v_2)$  et  $\text{Vect}(v_3)$  ?
2.  $\text{Vect}(v_1, v_2)$  et  $\text{Vect}(v_4, v_5)$  ?
3.  $\text{Vect}(v_1, v_3, v_4)$  et  $\text{Vect}(v_2, v_5)$  ?
4.  $\text{Vect}(v_1, v_4)$  et  $\text{Vect}(v_3, v_5)$  ?