

## Chapitre 2 : Équations et inéquations

### Un chapitre, un mathématicien

Mohammed AL KHWARIZMI (Khiva 788 – Bagdad 850)



Première page du  
*Kitab al jabr w'al muqabalah*

Originaire de la région du Kharezm, dans l'ouest de l'Ouzbékistan actuel, le mathématicien et astronome Mohammed AL KHWARIZMI demeure à Bagdad à l'époque de la splendeur de la dynastie abbasside. Comme les califes AL MAMOUM et AL MOUTASIM encouragent les sciences et les arts, AL KHWARIZMI peut se consacrer entièrement à sa passion pour les mathématiques.


Dans son traité, *Kitab al jabr w'al muqabalah*, il traite de façon systématique les équations du second degré. En utilisant l'*al jabr*, littéralement la remise en place, il transforme une soustraction dans un membre en une addition dans l'autre membre, tandis qu'*al muqabalah*,

littéralement le balancement, revient à supprimer dans les deux membres l'addition d'un même terme. Il ramène ainsi toutes les équations du second degré à six équations qu'il sait résoudre. Les méthodes sont purement algébriques, mais, influencé par les mathématiciens grecs, il les complète toujours par un procédé géométrique de résolution.

C'est le terme *al jabr*, qui, traduit en latin par *algebra*, a donné notre

mot algèbre.

Voici une illustration géométrique de l'identité  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  :



Comment démontrer les deux autres identités remarquables en utilisant un support géométrique ?

# 1 Égalités

**Définition.** On appelle **identité** une égalité entre deux expressions qui est vraie quelles que soient les valeurs des différentes variables employées.

**Exemple.** 1. Identités remarquables :  $\forall(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

2. En trigonométrie, on a :  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,

$$\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1.$$

# 2 Inégalités

## 2.1 Notations

**Définition.** Une **inégalité** est un énoncé permettant de comparer l'ordre de deux objets.

### ► Inégalités strictes

La notation  $a < b$  signifie que  $a$  est **strictement inférieur** à  $b$ .  
La notation  $a > b$  signifie que  $a$  est **strictement supérieur** à  $b$ .

### ► Inégalités larges

La notation  $a \leq b$  signifie que  $a$  est **inférieur** (ou **inférieur ou égal**) à  $b$ . La notation  $a \geq b$  signifie que  $a$  est **supérieur** (ou **supérieur ou égal**) à  $b$ .

## 2.2 Propriétés

Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ ,

### ► Transitivité :

$$(a < b \text{ et } b < c) \implies a < c$$

### ► Addition :

$$a < b \implies a + c < b + c$$

### ► Passage à l'opposé :

$$a < b \implies -a > -b$$

### ► Multiplication et division :

Si  $c > 0$ , alors :

$$a < b \implies ac < bc \text{ et } \frac{a}{c} < \frac{b}{c}.$$

Si  $c < 0$ , alors

$$a < b \implies ac > bc \text{ et } \frac{a}{c} > \frac{b}{c}.$$

► Passage à l'inverse :

$$0 < a < b \implies \frac{1}{a} > \frac{1}{b}. \quad (\text{inversion de l'ordre})$$

$$a < b < 0 \implies \frac{1}{a} > \frac{1}{b}. \quad (\text{inversion de l'ordre})$$

$$a < 0 < b \implies \frac{1}{a} < \frac{1}{b}.$$


### 2.3 Valeur absolue

**Définition.** La valeur absolue d'un nombre réel est sa valeur numérique sans tenir compte de son signe.

Pour tout nombre réel  $x$ , la **valeur absolue** de  $x$ , notée  $|x|$ , est définie par :

$$\begin{cases} |x| = x, & \text{si } x > 0 \\ |x| = -x, & \text{si } x < 0 \\ |x| = 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

*Remarque.*  $|x| = \max(x, -x)$ .



**Proposition.** Pour tous réels  $a$  et  $b$  :

$$|a| \geq 0$$

$$|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

$$|ab| = |a| \times |b|$$

$$\text{Si } b \neq 0, \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

$$|a| = \sqrt{a^2}$$

**Proposition.** Les inégalités triangulaires :

$$|a + b| \leq |a| + |b| \quad ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

Comment traduire des égalités et inégalités simples faisant intervenir des valeurs absolues ?

Soient  $x$  un réel et  $a$  un réel tel que  $a > 0$ .

$$|x| = a \iff x = -a \text{ ou } x = a$$


$$|x| < a \iff -a < x < a$$

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$$


$$|x| > a \iff x < -a \text{ ou } x > a$$

$$|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ ou } x \geq a$$


►  $|x| = a \iff x = -a \text{ ou } x = a$



►  $|x| < a \iff -a < x < a$




►  $|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ ou } x \geq a$



*Remarque.* Que se passe-t-il lorsque  $a = 0$  ou  $a < 0$  ?

### La valeur absolue comme une distance

La quantité  $|x - y|$  mesure la distance entre deux points  $x$  et  $y$  de la droite réelle.



## 2.4 Intervalles

**Définition. (Intervalles de  $\mathbb{R}$ )** Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < b$  :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$$

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$$

$$[a, b[ = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}$$

$$]a, b[ = \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$

$$[a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x\}$$

$$]a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R}, a < x\}$$

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R}, x \leq b\}$$

$$]-\infty, b[ = \{x \in \mathbb{R}, x < b\}$$

$$]-\infty, +\infty[$$

## 3 Résolution d'équations et d'inéquations

Une **équation** est une égalité contenant une ou plusieurs variables, appelées **inconnues**. Résoudre une équation (ou une inéquation) d'inconnue  $x$  consiste à déterminer l'ensemble  $\mathcal{S}$ , appelé **ensemble des solutions**, des  $x$  vérifiant l'équation (ou l'inéquation). Autrement dit, on cherche à montrer l'équivalence :

$$\ll x \text{ vérifie l'équation (ou l'inéquation)} \gg \iff \ll x \in \mathcal{S} \gg$$

**Exemple.** On considère l'équation  $x^2 - 1 = 0$  d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ .

.....  
 .....  
 .....

## 3.1 Expressions polynomiales

**a) Degré 1 :  $ax + b$**

Toute équation du premier degré peut se mettre sous la forme

$$ax + b = 0.$$

1. Si  $a \neq 0$ , l'équation admet une unique solution :  $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$  ;
2. Si  $a = 0$  et  $b \neq 0$ , l'équation n'admet aucune solution :  $\mathcal{S} = \emptyset$  ;
3. Si  $a = 0$  et  $b = 0$ , l'équation admet une infinité de solutions :  $\mathcal{S} = \mathbb{R}$ .


**Exercice 1.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les trois équations suivantes :

$$1. \frac{x - 2}{3} = \frac{1 - 2x}{5}$$

$$2. 2(x + 4) + 1 - 5x = 3(1 - x) + 7$$


$$3. 3(2x + 4) - 2x = 14 - 2(1 - 2x)$$

► Si  $a > 0$  :



$x$	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	-	0	+

► Si  $a < 0$  :



$x$	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	+	0	-

**b) Degré 2 :**  $ax^2 + bx + c$

On appelle trinôme du second degré la quantité :

$$ax^2 + bx + c \quad \text{avec } a \neq 0.$$


On appelle discriminant du trinôme le réel  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

► Si  $\Delta > 0$  alors le trinôme a deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

On suppose  $x_1 < x_2$  :


$x$	$-\infty$	$x_1$	$x_2$	$+\infty$		
$ax^2 + bx + c$	signe de $a$		0	signe de $-a$	0	signe de $a$



► Si  $\Delta = 0$  alors le trinôme a une racine double :


$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

$x$	$-\infty$	$x_0$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de $a$		signe de $a$



► Si  $\Delta < 0$  alors le trinôme n'a pas de racine réelle.

$x$	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de $a$	



**Exercice 2.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes :

1.  $-2x^2 - 5x + 3 < 0$
2.  $-2x^2 + 5x - 4 \leq 0$
3.  $4x^2 - 4\sqrt{3}x + 3 > 0$



**c) Degré supérieur ou égal à 3**

**Exercice 3.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ .

**3.2 Équations et inéquations rationnelles**

**Exercice 4.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{4}{x+1} \leq 3$ .

**3.3 Équations et inéquations avec valeurs absolues**

**Exercice 5.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $|2x + 1| < |x + 2|$ .

**3.4 Équations et inéquations avec radicaux**

**Exercice 6.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $\sqrt{x^2 - 2x} = x - 3$ .