

Feuille d'exercices n°11

Géométrie élémentaire de l'espace

On note \mathcal{E} l'ensemble des points de l'espace. On munit \mathcal{E} d'un repère orthonormal direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Produit scalaire, produit vectoriel et produit mixte

Exercice 1. Soient A, B, C et D quatre points de \mathcal{E} de coordonnées respectives $(3, 0, -1)$, $(2, 1, -1)$, $(4, 2, 5)$ et $(3, 4, 3)$ dans \mathcal{R} .

1. Calculer les distances AB , AC et BC . Que peut-on en déduire ?
2. Calculer les produits scalaires $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et $\vec{BC} \cdot \vec{AD}$.
3. Déterminer les produits vectoriels $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ et $\vec{BC} \wedge \vec{AD}$.
4. Calculer le produit mixte $[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]$. En déduire le volume du parallélépipède engendré par \vec{AB} , \vec{AC} et \vec{AD} .

Exercice 2. Déterminer une base orthonormale directe de $\vec{\mathcal{E}}$ dont le premier vecteur est colinéaire au vecteur $(1, 2, 2)$.

Exercice 3. Pour quelles valeurs de a les vecteurs $(1, 0, a)$, $(a, 1, 0)$ et $(0, a, 1)$ constituent-ils une base de $\vec{\mathcal{E}}$?

Exercice 4. Soient A, B et C trois points de \mathcal{E} . Montrer que :

$$\forall M \in \mathcal{E}, \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{MB} \wedge \vec{MC} + \vec{MC} \wedge \vec{MA} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}.$$

Plans et droites

Exercice 5. Les points A, B et C définissent-ils un plan ? Si oui, en donner une représentation paramétrique, puis une équation cartésienne.

1. $A(2, 4, 0)$; $B(0, 6, 0)$; $C(6, 0, 0)$.
2. $A(1, 2, 0)$; $B(-2, 1, -4)$; $C(0, 3, 0)$.

Exercice 6. Déterminer une équation cartésienne et une représentation paramétrique du plan \mathcal{P} :

1. passant par $A(1, 0, 1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(1, -1, 2)$;
2. passant par $A(0, 1, 1)$ et engendré par les vecteurs $\vec{u}(1, -1, 0)$ et $\vec{v}(0, 0, 2)$;
3. passant par $A(1, -2, 3)$ et parallèle au plan \mathcal{Q} d'équation $5x + 3y - z + 1 = 0$;
4. plan médiateur du segment $[AB]$, avec $A(2, 0, -1)$ et $B(4, -2, 3)$.

Exercice 7. Montrer que les points $A(2, -3, 4)$, $B(1, 0, 2)$, $C(2, -1, 2)$ et $D(1, -1, 3)$ sont coplanaires.

Exercice 8. Déterminer une représentation paramétrique, ainsi qu'un système d'équations cartésiennes des droites :

1. \mathcal{D}_1 passant par le point $A(1, 2, -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1, -2, 4)$;
2. \mathcal{D}_2 passant par les points $B(1, 2, -3)$ et $C(0, 3, -4)$;
3. \mathcal{D}_3 passant par le point $D(2, 0, 1)$ et parallèle à \mathcal{D}_2 .

Parallélisme et alignement

Exercice 9. Les deux ensembles \mathcal{E}_1 et \mathcal{E}_2 donnés par les équations suivantes sont-ils parallèles ? Préciser la nature de ces ensembles.

1. $\mathcal{E}_1 : 4x - 2y + 6z - 1 = 0$ et $\mathcal{E}_2 : 6x - 3y + 9z = 0$.
2. $\mathcal{E}_1 : x - y + z - 1 = 0$ et $\mathcal{E}_2 : -x - y - z + 1 = 0$.
3. $\mathcal{E}_1 : \begin{cases} x = t \\ y = -1 - 3t \\ z = 2 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ et $\mathcal{E}_2 : \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.
4. $\mathcal{E}_1 : \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ et $\mathcal{E}_2 : 2x + y - z + 2 = 0$.

Exercice 10. $ABCDEFGH$ est un cube.

1. Montrer que les plans (BDE) et (CFH) sont parallèles.
2. On note P le centre de gravité du triangle BEG . Montrer que les points D , F et P sont alignés.

Orthogonalité

Exercice 11. Les deux ensembles suivants sont-ils perpendiculaires ?

1. $\mathcal{P}_1 : 4x + y - 2z - 1 = 0$ et $\mathcal{P}_2 : x + 2y + 3z - 2 = 0$.
2. $\mathcal{P}_3 : x + 2y - z - 3 = 0$ et $\Delta : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 - 4t \\ z = 3 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Exercice 12. $ABCDEFGH$ est un cube. Montrer que la droite (AG) est perpendiculaire au plan (BDE) .

Exercice 13. Soit Δ une droite de vecteur directeur \vec{u} , contenue dans un plan \mathcal{P} , et A un point n'appartenant pas à \mathcal{P} . On note H le projeté orthogonal de A sur \mathcal{P} , et L le projeté orthogonal de H sur Δ . Montrer que les droites (AL) et Δ sont perpendiculaires.

Intersection d'ensembles de points

Exercice 14. Déterminer l'intersection des ensembles suivants :

1. $\mathcal{P}_1 : x - 2y + 2z + 2 = 0$ et $\mathcal{P}_2 : 3x + y - z + 1 = 0$.
2. $\mathcal{P}_1 : y + z + 2 = 0$ et $\mathcal{P}_2 : x - y - 1 = 0$.
3. $\mathcal{D}_1 : \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t - 1 \\ z = -t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ et $\mathcal{D}_2 : \begin{cases} x = t \\ y = -t + 3 \\ z = -t + 1 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.
4. \mathcal{D} , la droite passant par $A(1, -2, -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-2, 3, 1)$, et \mathcal{P} , le plan d'équation $3x - 5y + z - 4 = 0$.
5. \mathcal{D} , la droite passant par $A(1, 2, 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1, -1, 1)$, et \mathcal{P} , le plan d'équation $x + 2y + z = 0$.
6. $\mathcal{P} : x - y + z + 2 = 0$, $\mathcal{Q} : 2x - 4y + 6z + 3 = 0$ et $\mathcal{R} : x - 2y + 3z = 0$.

Distance d'un point à une droite - Distance d'un point à un plan

Exercice 15. Déterminer la distance :

1. du point $A(1, 2, 1)$ au plan $\mathcal{P} : x - 2y + 3z = 1$;
2. du point $B(1, 2, -1)$ à la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \\ z = 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$;
3. du point $C(1, 0, 2)$ à la droite $\Delta : \begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x - y + z = -1 \end{cases}$.

Exercice 16. Soient A un point de \mathcal{E} de coordonnées $(2, 0, 1)$ dans \mathcal{R} , et \mathcal{P} le plan d'équation $2x + y - z + 3 = 0$.

1. Déterminer la distance du point A au plan \mathcal{P} .
2. On note H le projeté orthogonal de A sur \mathcal{P} . Déterminer les coordonnées du point H dans \mathcal{R} .
3. Retrouver le résultat de la question 1 en utilisant la question précédente.

Exercice 17. Soient \mathcal{D} la droite passant par $A(1, -2, 0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1, 1, -1)$, et B le point de coordonnées $(0, 1, -2)$ dans \mathcal{R} .

1. Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de B sur \mathcal{D} .
2. En déduire la distance de B à la droite \mathcal{D} .

Exercice 18. On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.

1. Déterminer la distance du point G au plan (BDE) .
2. En déduire le volume du tétraèdre $BDEG$.

Exercice 19. Soient \mathcal{P} et \mathcal{Q} les plans d'équations respectives $x + y + z - 1 = 0$ et $z = 0$ dans \mathcal{R} . Montrer que l'ensemble des points équidistants de \mathcal{P} et \mathcal{Q} est la réunion de deux plans orthogonaux.

Sphères

Exercice 20. 1. Déterminer le centre et le rayon de la sphère dont une équation cartésienne dans \mathcal{R} est :

(a) $\mathcal{S}_1 : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$;

(b) $\mathcal{S}_2 : x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z + 12 = 0$;

(c) $\mathcal{S}_3 : x^2 + y^2 + z^2 - x + 3y - 2z + \frac{17}{4} = 0$.

2. On note \mathcal{P} le plan d'équation $x + y + z - 3 = 0$.
Déterminer $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}_1$, $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}_2$ et $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}_3$.

Exercice 21. Soient I , J et K trois points de \mathcal{E} de coordonnées respectives $(0, 1, -1)$, $(-2, 0, 0)$ et $(1, 0, 1)$ dans \mathcal{R} . On note \mathcal{S} la sphère de centre I et de rayon 2.

Déterminer l'intersection de la sphère \mathcal{S} et de la droite (JK) .